## DUR점검 관련 변경사항 안내

## ① 마약류 패취제 사용기간 반영(\*24.11.5. 적용)

- 마약류 패취제 [1회 투약량] 또는 [총투여일수]에 사용기간(3~7일) 반영 ※ 1회 투약량에 소수점 기입하여 총 투여일수에 사용기간이 반영된 경우 총투여일수 적용
- 중복처방시 점검결과 상세 내용

DUR점검내역	<b>[마약</b> ] 9일 동일성분 중복
약품상세정보	<사용상 주의사항> 해당 성분의 1매 사용기간은 3일이므로, 처방전간 투여일수를 확인하여 처방 및 조제하시기 바랍니다. 비암성 만성통증에서 투여기간이 3개월 초과되지 않도록 주의바랍니다.(식약처 마약류의 오남용 방지를 위한 조치기준)

## ② 트라마돌 수진자별 정보 제공('24.11.12. 적용)

- **트라마돌 처방시** 수진자별 실시간 **일단위 총** 투여횟수, 총량 정보 제공 ※ 타기관 정보 포함
- 중복처방시 점검결과 상세 내용

DUR점검내역	[주의! 트라마돌] 1일 동일성분 중복, 동 수진자는 트라마돌주사제를 금일 타기관 2개소, 총 200mg 투약하였습니다.
약품상세정보	1일 최대 투여량 : 트라마돌염산염 400mg, <사용상 주의사항> 장기투여에 의한 내약성으로 인해 정신적, 육체적 의존성이 발생 가능

- ③ 마약류 의약품 처방·조제 사유입력('25.1.1. 적용, '24.11.4.~12.31. 시범운영)
  - 용량·투여기간주의 마약류(37성분) 초과 처방·조제시 사유 기재

내 용	코드
• 환자의 개인사정(선원, 장기출장, 여행 등)으로 인하여 장기 처방이 불가피한 경우	1
ㅇ 말기환자, 중증 신체장애를 가진 환자, 중증 신경학적 질환자, 중증 정신질환자	2
ㅇ 비마약성 진통제의 환자별 최대 용량에도 반응하지 않는 심한 통증	3
· 수술 후 급성기 통증	4
○ 처방·조제 사유코드 이외에 부득이하게 처방·조제하는 경우 의·약학적 적정사유를 기재	Т

○ 투여기간 초과시 점검결과 상세 내용

DUR점검내역 [마약류] 최대투여기간: 92일(1품목)
--------------------------------